

Couverture vaccinale des enfants de 11 ans scolarisés en CM2, en 2004/2005

Dr Colette Delmas,
Rectorat de Bordeaux

Données de l'enquête 2004/2005 BEH n°51-52 du 23/12/2005

- Depuis 1999, les services de santé de l'ENIe participent au cycle triennal d'enquêtes nationales, conduit par les Ministères de la santé, de l'Education Nationale et l'INVS
- Un échantillon de 7255 élèves a été constitué par sondage aléatoire à deux degré: tirage au sort d'écoles, puis d'élèves
- L'analyse a porté sur 6144 enfants de CM2 (88,5% de l'échantillon), nés en 1993 et 1994, âgés en moyenne de 10,9 ans, constitués de 50,3% de garçons et de 49,7% de filles

Couverture vaccinale élevée des enfants de 11 ans

- **BCG: 98,1%** (99,5% en 2001/2002)
- **DTPolio (5 doses reçues): 90,6 %**
(92,4% en 2001/2002)
- **Coqueluche (4 doses reçues): 90,9%**
(90,1% en 2001/2002); mais 38,3% ont déjà reçu une 5^{ème} dose à l'âge de 6 ans,pourtant recommandée à 11/13 ans
- **1^{ère} dose RRO: 95,7%**

Couverture vaccinale insuffisante

- **2^{ème} dose de RRO: 74,2%**
(52,1% en 2001/2002)
- **Hépatite B: 38,9%**
(33,5% en 2001/2002)
- **Haemophilus influenzae b (Hib) 4 doses: 53,6%**

Données régionales hépatite B

- Le taux de couverture en zone d'étude et d'aménagement du territoire sud ouest (ZEAT), est de **27,6% pour l'hépatite B** (métropole : 38,9%; IDF: 52,1%; DOM: 76,5%)
- Une meilleure couverture est assurée en zone urbaine (Paris: 53,6%) qu'en zone rurale (27%); en ZEP (47,4%) ainsi que pour les aînés et les enfants uniques

Données régionales RRO

- Le taux de couverture en ZEAT Sud ouest est de **67% pour le RRO 2 doses** ; il est de 74,2% en métropole; 81,2% en IDF; 77,2% dans les DOM
- Il est plus élevé en zone urbaine (Paris: 82,3%) et pour les aînés (77,5%) et les enfants uniques

conclusion

- Les données concernant le BCG (suspendu en 2007), le DTPolio et la coqueluche sont stables et très satisfaisantes
- La couverture RRO 1^{ère} dose est élevée, mais devra être obtenue plus précocément, avec une amélioration de la couverture à 2 doses (12 et 13/23 mois)
- La couverture hépatite B est encore faible (schéma à 3 doses: 2, 4 et 16/18 mois)
- L'enquête CM2 conduite en 2007/2008 permettra de suivre l'évolution